



EMCDDA - Harm Reduction Initiative

Incrementare l'offerta del test per HCV e l'invio alle cure delle persone che utilizzano sostanze per via iniettiva nei servizi per il trattamento delle dipendenze

Questionario sulle conoscenze indirizzato al personale dei servizi per le dipendenze

Introduzione:

Qual è il tuo livello di conoscenza sulle epatiti virali, i test e i trattamenti attualmente disponibili? Questo breve questionario ci aiuterà a trovare quali sono gli argomenti riguardo ai quali le persone si sentono meno sicure, così che sia possibile fornire maggiori informazioni e formazione su questi temi – e ci auguriamo che il questionario possa inoltre servire a rinfrescarti le idee!

Il questionario è anonimo e non è stato concepito per essere uno strumento di valutazione delle tue competenze, quindi puoi completarlo rispondendo sinceramente e senza timori.

A. Epatite C	lo sapevo già	é una novità per me
1. La prevalenza dell'infezione da epatite C nella popolazione generale in Europa è generalmente bassa (inferiore al 2%).	()	()
2. La prevalenza dell'infezione da epatite C nelle persone che consumano sostanze per via iniettiva in Europa è generalmente alta (spesso il 50% o anche più elevata).	()	()
3. I test e i trattamenti per l'epatite C offrono benefici sia per i diretti interessati che per la popolazione generale, poiché la trasmissione del virus si riduce.	()	()

	lo sapevo già	é una novità per me
4. Il virus dell'epatite C (HCV) si trasmette principalmente attraverso il sangue, e saltuariamente per via sessuale.	()	()
5. La probabilità di trasmissione dell'HCV per via ematica è molto più alta rispetto a quella dell'HIV.	()	()
6. L'HCV al di fuori dell'organismo può sopravvivere per ore o persino per interi giorni.	()	()
7. L'HCV può essere trasmesso attraverso la condivisione di siringhe e aghi già utilizzati.	()	()
8. L'HCV può essere trasmesso attraverso la condivisione di filtri già utilizzati da altri.	()	()
9. L'HCV può essere trasmesso attraverso la condivisione di cannuce per sniffare le droghe.	()	()
10. L'HCV non viene trasmesso attraverso il cibo, l'acqua potabile o i contatti casuali (strette di mano, coccole e baci).	()	()
11. L'HCV può essere trasmesso tra le persone che fanno uso di droghe per via iniettiva attraverso la condivisione di recipienti usati per attingere l'acqua necessaria all'iniezione.	()	()
12. Le persone che utilizzano sostanze per via iniettiva possono contrarre l'HCV condividendo cucchiari per la preparazione della droga da iniettare.	()	()
13. Il primo livello di diagnosi per l'epatite C consiste nella somministrazione di un test per la ricerca di anticorpi contro l'HCV (per sapere se si è positivi agli anti-HCV).	()	()

	lo sapevo già	é una novità per me
14. Sono disponibili dei test rapidi diagnostici per la ricerca anticorpale che prevedono il prelievo di una goccia di sangue dal polpastrello o di liquido orale. Sono di facile utilizzo e consentono una risposta in tempi molto brevi (entro 20 minuti).	()	()
15. Essere anti-HCV positivi può significare avere un'infezione da HCV attiva, o averla avuta in passato ed esserne guariti.	()	()
16. Per sapere se una persona ha un'infezione da HCV in atto, è necessario effettuare un altro test ematico: il test di Polymerase Chain Reaction (PCR) o il Core Antigen test.	()	()
17. Se adeguatamente informata, la maggioranza delle persone che utilizzano sostanze per via iniettiva a cui viene proposto il test accetta di farlo e apprezza la possibilità di conoscere il proprio stato sierologico.	()	()
18. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda di proporre l'effettuazione regolare del test alle persone che continuano a esporsi a rischi connessi al consumo di sostanze per via iniettiva.	()	()
19. Le persone con epatite C in fase acuta potrebbero presentare sintomi specifici poco dopo l'infezione (ad esempio dolori nella parte superiore dell'addome, ittero, nausea), oppure talvolta solo sintomi aspecifici (stanchezza), ma spesso non hanno alcun sintomo.	()	()
20. Un'infezione da HCV cronicizza nella maggior parte dei casi.	()	()
21. La maggioranza delle persone con epatite C cronica non presenta alcun sintomo per decenni.	()	()

	lo sapevo già	é una novità per me
22. Non è possibile capire se una persona ha l'epatite C solo basandosi sul suo aspetto esteriore.	()	()
23. Se non trattata, l'epatite C cronica può causare gravi danni al fegato e, in alcuni casi, la cirrosi e il cancro del fegato.	()	()
24. Non esiste un vaccino per l'epatite C.	()	()
25. Non è sufficiente sciacquare con acqua gli aghi e altro materiale per iniezione per proteggersi dalla trasmissione dell'HCV.	()	()
26. I preservativi possono prevenire la trasmissione sessuale dell'HCV.	()	()
27. Dopo avere trattato con successo l'epatite C, è possibile reinfezzarsi se ci si espone nuovamente al virus.	()	()
28. Il test per verificare la presenza del virus dell'epatite C dovrebbe essere ripetuto regolarmente dopo aver completato il trattamento.	()	()
29. Oggi l'epatite C può essere curata in quasi tutti i casi.	()	()
30. Trattare l'epatite C previene i danni a lungo termine alla salute.	()	()
31. Il trattamento per l'epatite C consiste nell'assunzione di pastiglie per un periodo che di solito varia tra le 8 e le 12 settimane.	()	()

	lo sapevo già	é una novità per me
32. Le linee guida internazionali raccomandano di offrire un trattamento a tutte le persone che usano droghe per via iniettiva e risultano positive al HCV, indipendentemente dallo stadio della malattia.	()	()
B. Epatite B	lo sapevo già	é una novità per me
1 Il virus dell'epatite B (HBV) può essere trasmesso attraverso l'attività rapporti sessuali senza preservativi o il sangue, e anche da madre a figlio.	()	()
2. L'utilizzo dei preservativi può prevenire la trasmissione sessuale dell'HBV.	()	()
3.L'epatite B può cronicizzare, ma tale eventualità è molto meno frequent eche per l'epatite C.	()	()
4.Esiste un vaccino efficace contro l'epatite B.	()	()
5.Per prevenire efficacemente l'infezione da HBV idealmente dovrebbero essere somministrate tre dosi del vaccino.	()	()
6. Oltre all'effettuazione del test per HCV, le persone che utilizzano sostanze per via iniettiva dovrebbero sottoporsi anche allo screening per HBV, HIV e altre infezioni sessualmente trasmissibili.	()	()

C. Situazione personale

sí

non sono
sicuro

no

1. Conosci il tuo stato sierologico per l'epatite B?

()

()

2. Conosci il tuo stato sierologico per l'epatite C?

()

()

3. Sei stato/a vaccinato/a contro l'epatite B?

()

()

()

D. Informazioni ulteriori

1. Con quale frequenza fornisci servizi alle persone che utilizzano sostanze per via iniettiva?

- regolarmente
 occasionalmente
 mai

2. In quale tipo di struttura lavori? (una sola possibilità di scelta)

- Servizio a bassa soglia (es. programmi di riduzione del danno: centri di prima accoglienza, stanze per il consumo di sostanze)
 Servizio ambulatoriale per il trattamento delle dipendenze
 Servizio residenziale per il trattamento delle dipendenze
 Carcere
 Altro

Se 'Altro' specificare: _____

Ti ringraziamo per aver completato il questionario.

Se siete interessati a maggiori informazioni sull'epidemiologia, la politica o la pratica dell'epatite C, visitate la nostra pagina delle risorse sull'epatite C:

<https://europa.eu/!YC89Tn>

È importante che gli operatori dei servizi per le dipendenze si sottopongano regolarmente al test e siano vaccinati contro l'epatite B – per cui assicurati di conoscere il tuo stato sierologico. Consulta qui i luoghi in cui è possibile sottoporsi al test:

<https://ecdc.europa.eu/en/test-finder>